

**ESPECIALIZAÇÃO  
NA ÁREA MÉDICA  
PUC-SP • 2025**



PUC-SP

Com Pré-Requisito  
**PEDIATRIA**

**INSTRUÇÕES**



O conteúdo desta prova é de propriedade da Fundação São Paulo. É expressamente proibida a sua reprodução, utilização em outros concursos, bem como o uso em sala de aula ou qualquer outro tipo, na totalidade ou em parte, sem a prévia autorização por escrito, estando o infrator sujeito à responsabilidade civil e penal.

# Instruções

- A duração da prova é de 1h30min, devendo o candidato permanecer na sala por, no mínimo, 30 minutos.
- A prova contém 30 questões objetivas, cada uma com quatro respostas, das quais apenas uma é correta.
- Assinale na folha ótica de respostas a alternativa que julgar correta, preenchendo com caneta esferográfica (azul ou preta), com traço forte, dentro do espaço. Evite amassar e rasurar.
- Não serão computadas as questões que contenham mais de uma resposta assinalada na folha ótica. Também não serão computadas aquelas respostas com emenda ou rasura, ainda que legíveis, assinaladas com traço fraco ou em branco.
- Desligue o celular, similares e quaisquer outros equipamentos eletrônicos e coloque-os no envelope designado para este fim.
- Não é permitido o uso de relógio, seja digital, seja analógico, com calculadoras ou outros recursos. Coloque-o no envelope também.
- Será excluído da seleção o candidato que lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova.
- Ao término da prova, o candidato deverá devolver ao fiscal o caderno de questões e a folha ótica de respostas.

**Boa prova!**



## ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA

### • Questão 01 •

**Sobre a epidemiologia da tonsilite aguda por estreptococo hemolítico do grupo A, assinale a alternativa correta:**

- a) O período de incubação da infecção geralmente é de três a sete dias.
- b) A infecção pelo estreptococo, quando tratada com antibióticos em até 48 horas, não é mais transmitida.
- c) A infecção pelo estreptococo acomete mais comumente crianças com a idade superior a três anos especialmente no inverno e na primavera.
- d) Entre as infecções invasivas graves pelo estreptococo, estão a pneumonia, peritonite, sepse, osteomielite e vaginite.

### • Questão 02 •

**Pré-escolar de três anos, com quadro de diarreia crônica e síndrome de má-absorção, está em uso de sonda nasogástrica há alguns dias. Nos últimos dias apresenta hipocalcemia e hipopotassemia de difícil correção apesar da oferta de cálcio e potássio. Esse distúrbio deve estar associado a baixos níveis de:**

- a) Sódio.
- b) Fósforo.
- c) Magnésio.
- d) vitamina D.

### • Questão 03 •

**Qual dos comportamentos a seguir é esperado encontrar nos marcos de desenvolvimento de uma criança de um ano de idade?**

- a) Transferir objeto de uma mão para outra.
- b) Balbuciar e sentar sem apoio.
- c) Subir escadas e correr.
- d) Ficar em pé e deambular conduzidos pela mão.

### • Questão 04 •

**Sobre o tratamento e as complicações da sinusite bacteriana aguda, assinale a alternativa correta:**

- a) As complicações orbitais são classificadas em celulite periorbital ou pré-septal e celulite orbital ou pós septal.
- b) Casos leves de celulite pré-septal podem ser tratados ambulatorialmente com dose alta de vancomicina e ceftriaxona oral.
- c) A terapêutica antibiótica apropriada para complicações intraorbitais inclui amoxicilina com clavulanato de potássio, ampicilina-sulbactam ou piperacilina-tazobactan.
- d) Na sinusite aguda, as complicações intracranianas são as mais comuns, incluindo meningite, empiema subdural e abscesso cerebral.

• Questão 05 •

Com relação as doenças ortopédicas relacionadas à dor musculo esquelética, correlacione a primeira e a segunda colunas.

(1) Doenças de Legg-Calvé-Perthes.	( ) Localiza-se, em geral, na virilha com irradiação para a coxa.
(2) Epifisiolise.	( ) Acomete o osso calcâneo.
(3) Doença de Osgood-Schlatter.	( ) É comum em esportistas entre 10 e 16 anos.
(4) Doença de Seve.	( ) Há necrose avascular da cabeça do fêmur.

a) 3-1-2-4.  
b) 2-4-3-1.  
c) 1-2-4-3.  
d) 4-1-3-2.

• Questão 06 •

O sinal sugestivo da dermatomiosite, que se caracteriza por inchaço e mancha arroxeadas ou vermelha em volta das pálpebras, é chamado de:

a) Miopático.  
b) Púrpura.  
c) Heliotropo.  
d) Sinal de Gottron.

• Questão 07 •

Sobre o hipotireoidismo associado a Síndrome Nefrótica Idiopática assinale a alternativa correta:

a) Apresenta resolução espontânea com a remissão da proteinúria.  
b) Caracteriza-se pela positividade de anticorpos antitireoglobulina.  
c) Caracteriza-se por níveis elevados de TBG.  
d) Caracteriza-se por diminuição dos níveis do hormônio estimulador da tireoide.

• Questão 08 •

Recém-nascido a termo apresentou cianose intensa necessitando de altas concentrações de oxigênio nas primeiras horas de vida. A saturação no membro superior direito era 94% e no membro inferior esquerdo era 85% quando o paciente estava submetido a uma FiO2 de 80%. O diagnóstico mais provável é:

a) Hipertensão pulmonar.  
b) Transposição de grandes vasos.  
c) Doença de membrana hialina.  
d) Estenose pulmonar grave.

• Questão 09 •

**Lactente com três semanas de vida nascido de parto normal, apresenta tosse seca há uma semana sem febre. Apresenta ainda taquipneia, hiperemia de conjuntiva ocular. Sem outras alterações no exame físico, apresentou conjuntivite nas primeiras semanas após o nascimento. Qual o antibiótico mais adequado para o tratamento?**

- a) Penicilina cristalina.
- b) Oxacilina.
- c) Claritomicina.
- d) Gentamicina.

• Questão 10 •

**Lactente de quatro meses é levado a consulta pediátrica e o pediatra verificou que o desenvolvimento neuropsicomotor estava adequado, exceto o controle da cabeça, que ainda não era eficiente. Qual a conduta ser seguida?**

- a) Orientar a mãe a colocar o lactente na posição sentada.
- b) Orientar a mãe a colocar o lactente em prono, com rolo sob o tórax para facilitar a extensão cervical.
- c) Orientar a mãe para aguardar mais um pouco.
- d) Orientar a mãe a colocar o lactente em supino e passar para a postura sentada.

• Questão 11 •

**Com relação a doença de Crohn, qual é a alternativa correta?**

- a) Os sintomas variam de acordo com o local do tubo digestivo acometido, as queixas mais frequentes são dor abdominal, diarreia, anemia, perda de peso, parada de crescimento e atraso do desenvolvimento puberal.
- b) As manifestações extraintestinais somente ocorrem após anos e evolução da doença.
- c) Criança com menos de cinco anos de idade nunca são acometidas pela doença de Crohn.
- d) Diarreia com sangue é imprescindível para o diagnóstico.

• Questão 12 •

**Na atresia extra-hepática das vias biliares, qual a alternativa correta?**

- a) A maioria dos casos apresenta desde o primeiro dia de vida acolia fecal e icterícia.
- b) O paciente com atresia biliar apresenta melhor prognóstico se a correção cirúrgica for realizada precocemente nos primeiros 90 dias de vida.
- c) A presença de sinais associados como vômito, diarreia, distúrbios neurológicos e hipoglicemia são sugestivos de atresia biliar.
- d) A atresia biliar consiste na obstrução completa da totalidade das vias biliares extra-hepáticas.

• Questão 13 •

**Quanto ao diagnóstico radiológico da Pneumonias Adquiridas na comunidade, assinale a alternativa correta.**

- a) O RX de tórax deve ser realizado em toda suspeita de pneumonia.
- b) O RX de tórax não é recomendado para crianças que estejam bem e possam receber o tratamento ambulatorial.
- c) A Ressonância Magnética é o exame de escolha para avaliar as complicações das pneumonias adquiridas na comunidade.
- d) A Ultrassonografia de tórax deve ser realizada em todos os casos de pneumonias adquiridas na comunidade para definir a extensão do processo e afastar o derrame pleural.

• Questão 14 •

**Sobre os derrames pleurais parapneumônicos, assinale a alternativa correta.**

- a) Os derrames pleurais parapneumônicos são transudatos.
- b) Só deve ser considerado empiema se o aspecto do líquido for purulento à punção.
- c) A mortalidade por conta deste problema é alta em todas as faixas etárias.
- d) Os agentes etiológicos envolvidos nessas condições são, em geral, semelhantes aos causadores das pneumonias.

• Questão 15 •

**Qual marcador pode ser usado como critério de admissão e alta em caso de desnutrição grave?**

- a) Eletrólitos.
- b) Circunferência braquial.
- c) Glicemia capilar.
- d) Proteína C reativa.

• Questão 16 •

**Menino com um mês de idade vem ao Pronto Socorro com quadro de estridor. Apresenta o mesmo quadro desde o nascimento que piora quando a criança chora. Melhora espontaneamente depois. Hoje após apresentar coriza apresentou evidente piora do estridor. Qual o diagnóstico mais provável?**

- a) Broncomalácia.
- b) Traqueomalácia.
- c) Imunodeficiência.
- d) Estenose de esôfago.

• Questão 17 •

**Pré-escolar de três anos, portador de anemia falciforme, é levado à emergência apresentando dor abdominal, palidez e prostração. Exame físico: t.tax.: 38°C, hipotônico, palidez cutânea acentuada, icterícia de esclera, taquicárdico, taquipneico, fígado: 1 cm do RCD, baço: 5 cm do RCE. A hipótese diagnóstica mais provável é:**

- a) crise aplástica.
- b) septicemia.
- c) colelitíase aguda.
- d) sequestro esplênico.

• Questão 18 •

**Na adolescência a mortalidade está principalmente ligada a que?**

- a) Causas externas.
- b) Tumores.
- c) Doenças infectocontagiosas.
- d) Doenças de parto e puerpério.

• Questão 19 •

Pré-escolar, quatro anos de idade, vem à consulta médica com edema de face e tosse há dois dias. Ao exame está em bom estado geral, com edema bipalpebral bilateral. Ausculta cardíaca normal. Pressão arterial em membro superior direito: 130/90 mmHg (PA > 95%). Pulmões: estertores subcrepitantes em bases pulmonares. Abdome normotenso, fígado a 2 cm do rebordo costal direito. Edema pré-tibial de uma cruz e pequenas lesões crostosas. Exames laboratoriais demonstram parcial de urina com densidade 1025, pH= 5,5; leucócitos 6.000/mL; hemácias 55.000/mL; proteínas +. Uréia 20 mg/dL e creatinina 0,5 mg/dL. Raio X de tórax demonstra aumento discreto de área cardíaca. Qual a principal hipótese diagnóstica?

- a) Síndrome nefrótica.
- b) Glomerulonefrite difusa aguda.
- c) Hipertensão arterial essencial.
- d) Traqueobronquite.

• Questão 20 •

Qual o principal parâmetro para o julgamento da necessidade de ajuste no plano de tratamento do paciente com asma?

- a) A avaliação periódica do controle da asma.
- b) O controle da asma.
- c) O número de internações.
- d) A gravidade da asma.

• Questão 21 •

Recém-nascido de parto vaginal, 36 semanas de gestação, Apgar 9/9, peso: 2.150 g, comprimento: 45 cm. Sua mãe é portadora de doença de Graves não tratada e não fez pré-natal. Neste caso, o recém-nascido provavelmente apresentará:

- a) Tireotoxicose.
- b) Hipotireoidismo.
- c) Bócio eutireoideo.
- d) Bócio hipotireoideo.

• Questão 22 •

Lactente de 20 meses é levado a serviço de pronto-atendimento devido a quadro de febre alta (39°C) recusa alimentar e vômitos há 48 horas. Ao exame físico apresenta hiperemia de orofaringe e úlceras no palato mole e nas Tonsilas, além de erupções cutâneas na palma das mãos e planta dos pés. A conduta indicada nesse caso, além da orientação dos pais, consiste na prescrição de:

- a) Aciclovir.
- b) Ganciclovir.
- c) Azitromicina.
- d) Sintomáticos.

• Questão 23 •

Pré-escolar de três anos apresenta, há seis meses, diminuição progressiva de força muscular em membros superiores, engasgos frequentes e, recentemente, diplopia e ptose palpebral. O diagnóstico mais provável é:

- a) Craniofaringioma.
- b) Miastenia gravis.
- c) Botulismo infantil.
- d) Distrofia muscular de Duchenne.

• Questão 24 •

Sobre a doença de Kawasaki, assinale verdadeiro ou falso e depois marque a sequência **correta**:

( ) É a vasculite mais comum na infância e de ocorrência rara em adultos.  
( ) É caracterizada por vasculite sistêmica de vasos de grande calibre.  
( ) Na maioria das vezes, tem evolução autolimitada, com duração média dos sintomas de 12 dias; entretanto os lactentes menores de seis meses têm maior chance de desenvolver aneurisma de coronária.  
( ) O reconhecimento e tratamento precoce diminuem a incidência de consequências coronarianas, resultando em melhores resultados clínicos.

a) V – F – V – V  
b) F – F – F – V  
c) V – V – V – F  
d) F – V – F – V

• Questão 25 •

Em relação à Síndrome de Guillain-Barré, é **correto** afirmar que:

a) Na maioria dos pacientes, os sintomas iniciam alguns dias após uma infecção viral, como zikavírus, vírus entéricos ou Covid-19.  
b) As mulheres são mais acometidas do que os homens.  
c) O diagnóstico é feito baseado na análise do liquor, em que há um aumento na celularidade com redução no nível de proteínas.  
d) O tratamento pode ser feito com doses de glicocorticoides altas plasmaférese, imunoglobulina intravenosa, todos com boa resposta na melhora dos sintomas, mesmo sendo utilizados isoladamente.

• Questão 26 •

Qual o diagnóstico?



a) Escabiose.  
b) Dermatite de contato.  
c) Impetigo.  
d) Larva migrans.

• Questão 27 •

Lactente de 45 dias é atendido no pronto-socorro com quadro de bronquiolite viral aguda. Antecedente prematuridade de 35 semanas, AIG, não necessitando de cuidados ventilatórios. Exame físico: regular estado geral, dispnéica, FR: 72 irpm, sem tiragem ou batimento de asas de nariz, MV presente e diminuído universalmente, com sibilos esparsos. Exames complementares: saturação de O<sub>2</sub> de 95% em repouso; radiografia de tórax: pulmões hiperinsuflados com reforço da trama broncovascular. O pediatra decide pela internação hospitalar. Quais alterações clínicas e ou laboratoriais que determinaram essa decisão?

- a) Estado geral e prematuridade.
- b) Radiografia de tórax e idade.
- c) Idade e FR elevada.
- d) Saturação de O<sub>2</sub> e prematuridade.

• Questão 28 •

Menina de quatro anos de idade apresenta petéquias nas extremidades superiores e inferiores e no tronco, sem outras alterações no exame físico. No hemograma a contagem de plaquetas é de 25.000/mm<sup>3</sup>. A contagem de leucócitos é de 9.000/mm<sup>3</sup> e a hemoglobina de 11 mg/dL. Qual das condutas abaixo seria a mais indicada?

- a) Solicitar a revisão do esfregaço no sangue periférico.
- b) Administrar imunoglobulina endovenosa.
- c) Prescrever transfusão de plaquetas.
- d) Solicitar hemocultura e iniciar terapêutica antimicrobiana empírica.

• Questão 29 •

Entre os testes a seguir, o que representa maior especificidade para o diagnóstico de infecção do trato urinário é:

- a) Leucocitúria.
- b) Nitrito positivo.
- c) Bacterioscopia de urina.
- d) Esterase leucocitária.

• Questão 30 •

É preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil a vacinação de gestantes, para prevenção de doenças infecciosas no neonato pela transferência de anticorpos maternos a vacinação para:

- a) Hepatite B, coqueluche e meningite C.
- b) Influenza, coqueluche e tétano neonatal.
- c) Influenza, doença pneumocócica e hepatite B.
- d) Tétano neonatal, coqueluche e diarreia por rotavírus.

O conteúdo desta prova é de propriedade da Fundação São Paulo. É expressamente proibida a sua reprodução, utilização em outros concursos, bem como o uso em sala de aula ou qualquer outro tipo, na totalidade ou em parte, sem a prévia autorização por escrito, estando o infrator sujeito à responsabilidade civil e penal.



FUNDAÇÃO SÃO PAULO

**Nucvest**  
vestibulares e concursos

[www.nucvest.com.br](http://www.nucvest.com.br)